

# Faktaark for frø

I den danske natur er der 8 forskellige arter af frøer. Den mest almindelige art er butsnudet frø.

**Art** Butsnudet frø (*Rana temporaria*)

## Udbredelse/levested

Butsnudet frø findes i næsten hele landet, undtagen på Bornholm, Lolland-Falster, Møn og Det sydfynske Øhav. I den varme halvdel af året lever den ved og i vandhuller, hvor den yngler, og om vinteren går den i dvale under jorden.

## Føde

Køddæder (insekter, regnorme, stankelben, snegle og til tider mindre individer af egen art)

## Højde/længde

5-11,1 cm

## Levealder

cirka 6 år

## Rugetid

Æg lægges i april/maj, klækkes derefter og i juni/juli vandrer haletudserne på land og er blevet til frøer.

## Antal unger

500-6000 æg

## Kønsmoden

2-3 år

**Alle frøer og salamandre i DK er fredet og må IKKE indsamles. Æg og haletudser for butsnudet frø må dog i et begrænset omfang indsamles til undervisningsbrug, hvis de efterfølgende sættes ud, hvor de oprindeligt blev fundet.**

## Faglitteratur

For børn: De små fagbøger – Padder (ISBN 9788702066852) og Smådyr i vandhullet (ISBN 9788712026747). Web: [www.danske-dyr.dk](http://www.danske-dyr.dk)

For voksne: Nordens padder og krybdyr (ISBN 87-12-02982-3) og Insekter i Danmark (ISBN 9788702078305)